

LIMED GABINET STOMATOLOGICZNY
MICHAŁ CHROBAK
Nr księgi rejestrowej: 00000191320
ZAKŁAD LECZNICZY: CENTRUM ORTODONCJI
I IMPLANTOLOGII LIMED



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: CENTRUM
ORTODONCJI I IMPLANTOLOGII LIMED
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Poradnia
stomatologiczna KOD:001
UL. ~~Olczakowska~~ 37, 53-010 Wrocław
Tel: 605058043
www.limed.eu

INFORMACJA O ZACHOWANIU PO IMPLANTACJI, AUGMENTACJI, ZABIEGU SINUSLIFTINGU

W celu lepszego przebiegu procesu gojenia się po zabiegu, proszę o przestrzeganie następujących wskazówek:

- w dniu operacji i dwa dni po operacji nie palić i nie nadużywać alkoholu;
- nie podejmować żadnego wysiłku fizycznego;
- jeść i pić dopiero po upływie miejscowego znieczulenia;
- przyjmować tylko płynne i miękkie pożywienie;
- nie gryźć w okolicach implantu;
- dbać o pozostałe zęby stosując ścisłą higienę jamy ustnej;
- usta w okolicy rany tylko przepłukiwać; w czasie po zabiegu nie używać elektrycznej szczoteczki do zębów w okolicy rany; po jedzeniu przepłukać jamę ustną zimną wodą lub płukanką zaleconą przez lekarza;
- nie dotykać okolic implantu palcami ani językiem;
- przy ewentualnych krwotokach skontaktować się natychmiast z lekarzem dentystą;
- w okolicy miejsca operacji, policzka i podbródka może wystąpić obrzęk, który po paru dniach zniknie, złagodzenie tych objawów można uzyskać stosując zimne okłady

Po zabiegu implanty zostają najczęściej natychmiast prowizorycznie zaopatrzone. Ostateczne zabezpieczenie następuje dopiero po upływie 16 do 28 tygodni po zabiegu.

Przy implantach dwufazowych, które zaszyto, to znaczy, kiedy implant nie wystaje z błony śluzowej, implanty, zostaną zabezpieczone śrubami zablizniającymi zwykle po upływie 16 do 28 tygodni. Dopiero później następuje właściwa rekonstrukcja protetyczna.

Ważne jest, żeby implanty były równomiernie obciążone. W razie gdyby Pan/Pani zauważył, że prowizoryczne zabezpieczenia implantów (korona, most tymczasowy) ruszają się (na skutek przedwczesnego kontaktu zębów), proszę natychmiast zgłosić się do lekarza dentysty na wizytę.

Zgoda na implantację wszczepów stomatologicznych do stosowania wyłącznie przez członków Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego-strona 7